



12TH

CHAPTER NOTES

(हस्तालिखित)

विषय - भौतिक विज्ञान

अध्याय - 5


चुंबकत्व एवं द्रव्य

चुंबकीय क्षेत्र

• चुंबक के गुण:

चुंबक को दो विशिष्ट मूर्खों द्वारा परिभ्रमित किया जाता है -

- आकर्षण गुण
- दैशक गुण



• चुंबकीय यांत्रोत्तर:

किसी उद्यान पर चुंबकीय यांत्रोत्तर टेक्सा कालपीनीक अवधिकर तल है जो उस स्थान पर्वतंत्र द्वारा द्वितीय निलंबित चुंबक के चुंबकीय अधर से छोकर गुजरता है।

• चुंबकीय बलों के मौलिक नियम :

$$F \propto P_1 P_2$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$F \propto \frac{P_1 P_2}{r^2}$$

$$F = k \frac{P_1 P_2}{r^2}$$

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P_1 P_2}{r^2} \quad (\because \mu_0 = \text{चुंबकशीलता})$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \Rightarrow \mu = \mu_r \mu_0$$

$$F = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{P_1 P_2}{r^2}$$

लवा के लिए $\mu_r = 1$

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P_1 P_2}{r^2} \Rightarrow$$

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P_1 P_2}{r^2} \hat{r}$$

$$F = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} N$$

इसकाका ध्रुव वह ध्रुव हैं जो अपने समान प्राबल्य के समानीय ध्रुव एवं निर्वित या छवा में इकांक दूरी (m) से निलग रखने पर $10^{-7} N$ के प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है।


ध्रुव प्राबल्य का इस मात्रक मेट्रिपर मीटर (Am) द्वारा है।

• चुंबकीय क्षेत्र:

$$\vec{B} = \frac{\vec{F}}{P_0}$$

किसी लिंग पर चुंबकीय क्षेत्र संख्यात्मक रूप से, उस लिंग पर प्रति इकांक चौराशण ध्रुव पर लगनेवाला बल है।

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{PP_0}{r^2} \hat{r}$$




$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{r^2} \hat{r}$$

• चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं:

चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ वैसे संतत काल्पनिक बिंदु वक्र हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव तक आते हैं।




• रासान चुंबकीय क्षेत्र में अवर्तन रूप से निलंबित चुंबक पर कार्यकारी बलयुग्म का आवृद्धि पर्याकरण:

$$\tau = PB \times SP = PB \times NS \times \frac{SP}{NS}$$

$$\tau = PB \times a \sin \theta = (PA) B \sin \theta = m B \sin \theta$$

$$\tau = \text{रासान बल} \times \text{बलों के बीच जांचक दूरी$$



$$T = m B \sin \theta$$

$$\vec{T} = \vec{m} \times \vec{B}$$

• चुंबकीय द्विघुत तथा धारा लूप:


$$T = I A B \cos \phi$$

$$\phi = \frac{\pi}{2} - \theta \text{ और } \cos \phi = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin \theta$$

$$T = I A B \sin \theta$$

$$\vec{T} = I \vec{A} \times \vec{B}$$

$$\vec{m} = I \vec{A}$$



इसका उल्लंश या विकिणी धूत नहीं होते हैं; वे छोशा द्विघुत के रूप में ही प्राप्त किए जाते हैं;

विघुत - आवेशों की गति ही चुंबकीय प्रवाहों का मूल कारण है,

• परमाणु के नक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विघुत - आवृद्धि चुंबकीय अनुपात तथा बोर मैनेटोन :

$$I = \frac{e}{T}$$

$$\text{आवर्तकाल } T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\text{तुरंग विघुतधारा (I)} = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r}$$


$$\mu_e = \text{धारा} \times \text{लूप में निहित क्षेत्रफल}$$

$$= I \times \pi r^2 = \left(\frac{ev}{2\pi r} \right) (\pi r^2)$$

$$\mu_e = \frac{evr}{2}$$

$$\mu_e = \frac{e(m_e vr)}{2m_e} = \frac{el}{2m_e}$$

$$\vec{\mu}_e = -\frac{e \vec{l}}{2m_e}$$



पूर्ण चुंबकीय अनुपात :-

$$\frac{\mu_e}{\lambda} = \frac{e}{2me}$$

$$= \frac{(1.6 \times 10^{-19} C)}{2 \times (9.1 \times 10^{-31} kg)}$$

पूर्ण चुंबकीय अनुपात = $9.8 \times 10^{10} C/kg$

लेखनदृष्टि :

$$\lambda = \frac{n\ell}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\ell = \text{तांक - नियंता} = 6.62 \times 10^{-34} J.s.$$

$$\mu_e = \frac{e\lambda}{2me} = \frac{e}{2me} \left(\frac{n\ell}{2\pi} \right) = \frac{n\ell e}{4\pi me}$$

$$(\mu_e)_{\min} = \frac{e\ell}{4\pi me} = \frac{(1.6 \times 10^{-19} C) \times (6.62 \times 10^{-34} J.s)}{4 \times 3.14 \times (9.1 \times 10^{-31} kg)}$$

$$(\mu_e)_{\min} = 9.28 \times 10^{-24} A.m^2$$

• चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विशेषण में किया गया कार्य :

$$T = mB \sin \phi$$

$d\omega = \text{बलचुमा - आवूर्ण} \times \text{कोणीय विरसापन}$


$$d\omega = mB \sin \phi d\phi$$

$$\omega = \int d\omega = \int_0^\theta mB \sin \phi d\phi$$

$$\omega = mB[-\cos \phi]_0^\theta = mB[\cos \phi]_0^\theta$$

$$\omega = mB(\cos \theta - \cos 0) = mB(1 - \cos \theta)$$

$$\boxed{\omega = mB(1 - \cos \theta)}$$



• रसायनमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विघुव की स्थिति का अर्जी :

$$\omega = mB(1 - \cos \theta)$$

$$\omega(\theta) = mB(1 - \cos \theta)$$

$$\omega(\theta_2) = mB(1 - \cos \theta_2)$$

$$\Delta \omega = \omega(\theta_2) - \omega(\theta_1) = (-mB \cos \theta_2) - (-mB \cos \theta_1)$$

$\Delta \omega$ = उंतिम स्थिति अवृ-प्रारंभीक स्थिति अवृ

$$\Delta \omega = \omega(\theta_2) - \omega(\theta_1)$$

$$U(\theta_2) - U(\theta_1) = (-mB \cos \theta_2) - (-mB \cos \theta_1)$$


$$U(\theta) = -mB \cos \theta$$

$$U(\theta) = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$




$$\theta = 0^\circ$$

$$U = -mB$$



$$\theta = 90^\circ$$


$$U = 0$$



$$\theta = 180^\circ$$

$$U = +mB$$

- अनक्षीय स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र :



$$B_n = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{NP^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{(r-l)^2}$$

$$B_s = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{SP^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{(r+l)^2}$$

$$B_e = B_n - B_s = \frac{\mu_0}{4\pi} P \left[\frac{1}{(r-l)^2} - \frac{1}{(r+l)^2} \right]$$

$$B_e = \frac{\mu_0}{4\pi} P \frac{4rl}{(r^2-l^2)^2}$$

$$B_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2mr}{(r^2-l^2)^2} \quad (\because P \times 2l = m)$$

परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B_e , N से P की दिशा में होगा, अर्थात् चुंबक के आवृण्ण (म) के अनुदिश होगा,

$$\vec{B}_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m} \times \vec{r}}{(r^2 - l^2)^2}$$

$$\vec{B}_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m} \times \vec{r}}{r^4} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{r^3} \quad (\because r \gg l)$$

$$\vec{B}_e \propto \frac{1}{r^3}$$

• निरक्षीम स्थिति में किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र:

$$PS^2 = OP^2 + SO^2$$

$$PS = \sqrt{OP^2 + SO^2} = \sqrt{r^2 + J^2}$$

$$PN = \sqrt{OP^2 + ON^2} = \sqrt{r^2 + J^2}$$

$$B_n = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{PN^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{(r^2 + J^2)}$$


$$B_s = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{PS^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{(r^2 + J^2)}$$

के परिपाणी चुंबकीय क्षेत्र \vec{B}_e की विशा चुंबकीय अक्ष NS के समांतर N एवं S की ओर होती है,

$$B_b = B_n \cos\alpha + B_s \cos\alpha = 2B_n \cos\theta \quad (\because B_n = B_s \text{ एवं } \alpha = \theta)$$

$$B_b = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{P}{(r^2 + J^2)} \frac{J}{\sqrt{r^2 + J^2}}$$

$$\therefore B_b = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + J^2)^{3/2}}$$



$$\boxed{\vec{B}_b = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m}}{(r^2 + J^2)^{3/2}}}$$

$$B_b = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3} \quad (\because r \gg J)$$


$$B_b \propto \frac{1}{r^3}$$

• उदासीन बिंदु:

अवश्या - ५) यदि चुंबकीय यान्त्रोत्तर में इस प्रकार रखा जाए कि उभया उत्तरीय ध्रुव गोलिक उत्तर की ओर हो

चुंबक के उत्तरी ध्रुव जो गोलिक उत्तर विशा की ओर रखने पर उदासीन बिंदुओं की स्थिति निरक्षीय रखा पर जाती है।


$$B_m = B_n = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + J^2)^{3/2}}$$



अवस्था - (i): यहाँ, चुंबक को चुंबकीय यांत्रोलम् में ऐस प्रकार रखा जाएँ कि उसका उत्तरी धूत और्गोलिक दिशा की ओर हो, चुंबक के उत्तरी धूत को और्गोलिक दिशा की ओर रखने पर उत्तरी अक्षीय दिशा पर होती है,

उत्तरी अक्षीय दिशा की स्थिति अक्षीय रेखा पर होती है,

$$B_m = B_e = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2mr}{(r^2 - l^2)^2}$$





• यद्दं चुंबक का राक धरावाली परिनामिका और उन्नाचरण:

$$\vec{m} = N \vec{I} \vec{A}$$

N = फेरों की कुल संख्या

I = प्रवाहित तिकृत-धारा

\vec{A} = ध्रेतफल संहिता




सूक्ष्मक लंबाई में फेरों की अंख्या (n) = $N/2l$

वृत्ती काट ली त्रिज्या = a

परिनामिका की लंबाई = $2l$

फेरों की कुल संख्या = N



$$dB = \frac{\mu_0 (n dx) I a^2}{2[(r-x)^2 + a^2]^{3/2}}$$

$$[(r-x)^2 + a^2]^{3/2} = (r^2)^{3/2} = r^3 \quad (\because a \ll r \text{ तथा } 2l \ll r)$$

$$dB = \frac{\mu_0 n I a^2 dx}{2 r^3}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 n I a^2}{2 r^3} \int_{-l}^l dx = \frac{\mu_0 n I a^2 2l}{2 r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0 (N/2l) I a^2 2l}{2 r^3} = \frac{\mu_0 N I a^2}{2 r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2NIA}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{2NIA}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}$$

$$(\because m = NIA)$$


• इक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूलनशील चुंबक के आवर्तकाल का ट्यूनिंग :

$$T = -m B_e \sin \theta$$

$$T = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

$I = \text{धारा}$ के परिवर्तन चुंबक का अवृत्त - आपूर्ण

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = \text{कोणीय त्वरण}$$



$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -m B_e \sin \theta = -m B_e \theta$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{m B_e \theta}{I}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} \propto -\theta$$

कोणीय त्वरण \propto कोणीय विस्थापन

त्वरण $= -\omega^2$ विस्थापन

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\omega^2 \theta$$

कोणीय आवृत्ति $= \omega = \frac{2\pi}{T}$

आवर्तकाल $= T$

$$\omega^2 = \frac{m B_e}{I} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{m B_e}{I}} \text{ या } \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{m B_e}{I}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{m B_e}}$$

चुंबक या चुंबकीय शूरू का चुंबकीय आपूर्ण $= m$

पृष्ठी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षीतिज वर्तक $= B_e$

निलंबन-धारा $= I$

नोट: यदि चुंबक का आकार बेलनकार हो तो

$$I = \omega = \left(\frac{l^2}{12} + \frac{R^2}{4} \right)$$

$\omega = \text{चुंबक का व्रत्यगान}$, $l = \text{जीबाहु}$, $R = \text{त्रिज्या}$

पदार्थ के चुंबकीय गुण: पर्यावरणीय चुंबकत्व

• चुंबकीय प्रेरण:

चुंबकीय पदार्थ में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से चुंबकीय आवृत्ति के उस प्रकाश प्रेरण छोड़ने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है।

• चुंबकन:

पदार्थ के प्रति इकांक आयतन में निर्दित परिणामी चुंबकीय आवृत्ति-शीद्धि का परिणाम उस बिंदु पर चुंबकन कहलाता है।

अतः, परिश्रांता के अनुसार,

$$M = \frac{m}{V}$$

जहाँ m = चुंबकीय आवृत्ति,

V = आयतन

$$M = \frac{PL}{AL} = \frac{P}{A} = \frac{\text{ध्रुव-प्राबल्य}}{\text{अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल}}$$

किसी पदार्थ का चुंबकन उसके प्रति इकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ध्रुव प्राबल्य का परिणाम है।

चुंबकन का इमानदार इमिपियर मीटर (Am^{-1}) होता है।

~~$$\omega = 2\pi f$$~~


• चुंबकीय तीव्रता :

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_M$$

$$\vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{B}_M = \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$



$$\boxed{\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}}$$

चुंबकीय तीव्रता के सविक्षण शाश्वत है तथा उसका एक मानक है सोम्पेयर एमीटर $(A m^{-1})$

• चुंबकशीलता :

किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र है तथा चुंबकीय तीव्रता में की निष्पत्ति के बराबर होती है।

$$\text{अर्थात्}, \quad \text{चुंबकशीलता } \mu = \frac{B}{H}$$

$$B = \mu H$$

$$\boxed{\mu = \frac{\mu_0}{\mu_0}} \Rightarrow \mu = \mu_0 \mu_0$$

आपेक्षिक चुंबकशीलता के ही संदर्भ में पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है - प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय रखे जाने वाले चुंबकीय पदार्थ।

• चुंबकीय प्रवृत्ति :

$$\boxed{\chi_M = \frac{M}{H}}$$

किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई चुंबकीय तीव्रता के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन के बराबर होती है।

- चुंबकीय प्रवृत्ति (χ_m) रखें आपेक्षिक चुंबकशीलता (μ_H) के बीच संबंधः

$$\mu H = \mu_0 H + \mu_0 M$$

$$\frac{\mu}{\mu_0} H = H + M \quad (\because \mu_H = \frac{\mu}{\mu_0})$$

$$\mu_H = 1 + \frac{M}{H}$$


$$\boxed{\mu_H = 1 + \chi_m}$$

$$(\therefore \chi_m = \frac{M}{H})$$

- प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थः

(१) प्रतिचुंबकीयः


वैसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आधिक प्रवृत्ति वाले भाग से कम प्रवृत्ति वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है।



प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति संख्या रूपों का कम, लेकिन निकटतः कठिनात्मक होती है।

(२) अनुचुंबकात्मकः

वैसे पदार्थ अनुचुंबकीय होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में इखे जाने पर उल्का चुंबकात्मक प्राप्त कर लेते हैं। तथा उन्हें छोड़ चुंबकीय क्षेत्र से प्रवृत्ति वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है।



$$M = C \frac{B_0}{T}$$

$$\boxed{\chi = \frac{C \mu_0}{T}}$$

$$(\because B_0 = \mu H)$$

$$(\therefore M = \chi H)$$

$$Z = \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} \quad \ell_t = l_0(1+\alpha \Delta t) \quad I = \frac{U_e}{R+R_i} \quad \omega = 2\pi f$$

$$f_0 =$$

$$\phi \\ C(s) \\ V_L = \sqrt{L}$$

$$\gamma =$$

$$\left(\frac{E_t}{E_0} \right) \\ E_y = E$$

$$S =$$

$$E_K$$

$$-\frac{t^2}{2m}$$

$$U_e$$

$$B = \mu$$

$$K = P$$

$$Z =$$

$$f =$$

$$\phi \\ C(s) \\ V_L = \sqrt{L}$$

$$\gamma =$$

$$\left(\frac{E_t}{E_0} \right) \\ E_y = E$$

$$S =$$

$$E_K$$

$$-\frac{t^2}{2m}$$

$$U_e = U_m \quad E = \hbar \omega$$

$$T_{dt} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad 4\pi r^2 \quad X_L = \frac{U_m}{I} = \omega L = 2\pi f \quad k = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \quad V_L = \sqrt{\mu M_z / R_z} \quad \vec{F}_m = \vec{B} \vec{I} \ell = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \ell$$

• जौह-चुंबकत्वः

कुछ पर्याप्त से से भी लेते हैं। जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति (x_m) तो धनात्मक छोटी ही है, अनुचुंबकीय पराधों की तुलना में कनका मान बहुत अधिक (1,200 रुपए 12,000 तक) होता है।

• ताप का प्रभावः

$$\chi = \frac{C}{T - T_c}$$

C = कथूरी ताप

T_c = कथूरी बिंदु

• प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय रूप जौह-चुंबकीय पराधों का अध्ययनः

प्रतिचुंबकीय

- चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में डबपर मंद विकर्षण होता है।
- इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता (μ_r) शक्तक कम होती है।
- इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति (x_m) का मान दूरी और धनात्मक होता है।
- ताप के परिवर्तन से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अनुचुंबकीय

- जौह-चुंबकीय पराधों की तुलना में उनमें अनुकरण कम होता है।
- इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता शक्तक से बहुत छोटी है।
- इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दूरी और धनात्मक होता है।
- इन पराधों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।


जौह-चुंबकीय

- चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है।
- इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता शक्तक से बहुत छोटी है।
- इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता शक्तक से बहुत छोटी है।
- इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत बड़ी होती है।
- ताप-वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अनियन्त्रित और जटिल रूप से बदलती है।

• चुंबकीय शैदिल्य :

चुंबकीय तीव्रता H के शून्य से जाने पर, पदार्थ में छोड़ा गया चुंबकीय क्षेत्र B अवशिष्ट चुंबकत्व अथवा घारणशीलता B_r कहलाता है।

ऐसा क्रम जो किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र B के दूरी परिवर्तन चक्र को प्रदर्शित करता है, शैदिल्य लूप कहलाता है।



• नर्म लोडे तथा इस्पात के चुंबकीय गुणों की तुलना :

• पुर्णकशीलता :

चुंबकशीलता $\mu_r = B/H$ इस्पात की अपेक्षा नर्म लोडे के लिए अधिक होती है,

• घारणशीलता :

नर्म लोडे की घारणशीलता इस्पात की अपेक्षा अधिक होती है।

• निग्राहित :


नर्म लोडे की निग्राहित इस्पात की अपेक्षा होती है,

• शैदिल्य ज्ञान :

चुंबकन के प्रत्येक चक्र में पदार्थ के गतिक आवृत्ति में होनेवाली शैदिल्य ज्ञान इस्पात की अपेक्षा नर्म लोडे के लिए कम होती है।

• पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र :

पृथ्वी के किसी स्थान पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से गुजरनेवाले ऊर्ध्वाधर तल को उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय आन्तरिकतर कहते हैं।



किसी स्थान पर औरोलिक अक्ष से मुजबनेवाले ऊर्धवायर
तल को औरोलिक यांत्रोलर कहते हैं।

• पृथ्वी के चुंबकीय तत्व:

किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम
और विद्या का पूर्ण ज्ञान जिन शिखों से प्राप्त
जोता है, उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व
कहते हैं। ये तत्व निम्नान्कित हैं:-

1- विकृपात

2- नति या नमन

3- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक

$$B^2 = B_h^2 + B_v^2 \quad \therefore B = \sqrt{B_h^2 + B_v^2}$$

$$\cos \delta = \frac{B_h}{B} \quad \therefore B = \frac{B_h}{\cos \delta}$$

$$\tan \delta = \frac{B_v}{B_h} \quad \therefore B_v = B_h \tan \delta$$

• आभासी नमन और यर्थीय नमन में संबंध:

$$\tan \delta_1 = \frac{B_v}{B_h} = \frac{B_v}{B_h \cos \theta} \quad (\text{आभासी नमन})$$

$$= \tan \theta \sec \theta$$



$$\cot \delta_1 = \frac{B_h}{B_v} \cos \theta$$

$$\cot^2 \delta_1 = \frac{B_h^2}{B_v^2} \cos^2 \theta$$

$$\tan \delta_2 = \frac{B_v}{B_h} = \frac{B_v}{B_h \sin \theta}$$

$$\cot \delta_2 = \frac{B_h}{B_v} \sin \theta$$

$$\cot^2 \delta_2 = \frac{B_h^2}{B_v^2} \sin^2 \theta$$



$$+\tan \delta = \frac{B_v}{B_h} \quad (\text{असाधी लम्ब})$$

$$\cot^2 \delta = \frac{B_h^2}{B_v^2}$$

$$\cot^2 \delta_1 + \cot^2 \delta_2 = \frac{B_h^2}{B_v^2} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \frac{B_h^2}{B_v^2}$$

$$\boxed{\cot^2 \delta_1 + \cot^2 \delta_2 = \cot^2 \delta}$$



12TH

CHAPTER NOTES

(HANDWRITTEN)

SUBJECT-PHYSICS

CHAPTER - 5

MAGNETISM AND MATTER

CHAPTER-5 MAGNETISM AND MATTER

Magnetism:- The phenomenon of attraction of small bits of iron, steel, cobalt, nickel etc. towards the ore is called magnetism.

Characteristics of magnet:-

- ① Monopole does not exist.
- ② Repulsion is a sure test of magnetisation.
- ③ If we break a magnet perpendicular to the axis then pole strength remains unchanged.
- ④ If we break the magnet along the axis into two length of equal part. pole strength becomes half.

magnetic field lines:-

Their properties are as follows.

- ① Two magnetic field lines cannot intersect each other.
- ② They form continuous closed loop.
- ③ The tangent at any point on the magnetic field represents the ~~the~~ magnetic field.

MAGNETIC DIPOLE:-

An arrangement of two equal and opposite magnetic pole separated by a small distance.

magnetic dipole moment (m) It is defined as the product of its pole strength with the magnetic length of the magnet.

$$m = q_m \cdot 2l$$

magnetic field at axial position:-



p is any point on the axial line at a distance R from the centre.

$$\vec{F}_N = \frac{K q_m q_{m0}}{(r-a)^2} \hat{i}$$

$$\vec{F}_S = \frac{K q_m q_{m0}}{(r+a)^2} (-\hat{i})$$

$$\vec{F}_{net} = (\vec{F}_N - \vec{F}_S) \hat{i}$$

$$= \left[\frac{K q_m q_{m0}}{(r-a)^2} - \frac{K q_m q_{m0}}{(r+a)^2} \right] \hat{i}$$



$$= K q_m q_{m_0} \left[\frac{1}{(r-a)^2} - \frac{1}{(r+a)^2} \right] \hat{i}$$

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{2 K \vec{m} r q_{m_0}}{(r^2 - a^2)^2} \hat{i}$$

$$\vec{B}_{\text{net}} = \frac{\vec{F}_{\text{net}}}{q_{m_0}} = \frac{2 K \vec{m} r}{(r^2 - a^2)^2} (\hat{i})$$

when the magnet is short acc to, a^2 can be neglected.


$$\vec{B}_{\text{net}} = \frac{2 K \vec{m} r}{r^4} = \frac{2 K \vec{m}}{r^3}$$

Torque on a magnetic field Dipole in a magnetic field.

In $\Delta S N P$

$$\sin \theta = \frac{N P}{N S}$$

$$P N = 2 a \sin \theta$$



The force acting on the south pole is towards left. The force acting on the north pole is towards right.

$$\vec{F}_{\text{net}} = q_m \vec{B} - \vec{q}_m \vec{B} = 0$$

As the forces are not in same line of action. So net $\tau \neq 0$. So they constitute a couple due to which the dipole rotates.

$$\begin{aligned}\tau &= \text{magnitude of force} \times \perp r \text{ dist.} \\ &= q_m B \cdot 2a \sin \theta\end{aligned}$$

$$\tau = B_m \sin \theta$$

$$\tau = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$\boxed{\tau \perp \vec{m} \quad \text{and} \quad \vec{\tau} \perp \vec{B}}$$

case 1:- when $\theta = 0^\circ$

$$\boxed{\tau = 0} \quad \text{stable equilibrium}$$

case 2:- when $\theta = 180^\circ$


$$\boxed{\tau = 0} \quad \text{unstable equilibrium}$$

case 3:- when $\theta = 90^\circ$

$$\boxed{\tau = B_m} \quad \text{maximum torque.}$$

Potential Energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field:

Let the magnetic dipole moved through a small change in angle $d\theta$ and torque acting on dipole is τ .



Then the small work done in moving dipole

$$dw = \tau d\theta$$

$$\Rightarrow \int_0^w dw = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau d\theta$$

$$w = \int_{\theta_1}^{\theta_2} mB \sin\theta d\theta$$

$$= mB \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta d\theta$$

$$= mB (-\cos\theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2}$$

$$= -mB (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$$w = -mB (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$$w = mB (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

If initial angle $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ and $\theta_2 = \theta$.

then

$$\omega = mB(-\cos\theta)$$

$$U = -mB\cos\theta$$

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

Gauss law in magnetism:-

$$\boxed{\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0}$$

The surface integral of magnetic field over a closed surface is always 0. as magnetic monopole never exist.

The magnetic flux around a closed surface is 0.

Elements of Earth magnetic field:-

① Angle of dip: It is the angle made by the resultant magnetic field of earth with horizontal in magnetic meridian.

Horizontal component:-

It is the component of earth magnetic field along horizontal.

It is 0 at the pole and 90° at the equator.

Declination:-

It is the angle between geographical meridian and magnetic meridian.

It is measured as θ° east or θ° west

ABCD \rightarrow magnetic meridian.

θ \rightarrow declination


δ \rightarrow angle of dip.

$$B_H = B \cos \delta$$

$$B_U = B \sin \delta$$

$$B = \sqrt{B_H^2 + B_U^2}$$

$$\tan \delta = \frac{B_U}{B_H}$$



Some Important Terms used to describe magnetic properties of materials:-

① Intensity of magnetisation: It is defined as dipole moment of substance per unit volume

$$I = \frac{m}{\text{Volume}} = \frac{q_m \times 2l}{A \times 2l} = \frac{q_m}{A}$$

for diamagnetic substance, I is -ve

for paramagnetic substance I is +ve

for ferromagnetic substance I is highly +ve

② Intensity of magnetic field: It is defined as the ratio between the external applied magnetic field to the permeability.

③ Magnetic susceptibility: It is defined as the ratio of intensity of magnetisation and the magnetising field

$$\chi = \frac{I}{H}$$

For dia it is -ve, for para it is +ve and for ferromagnetic substance it is highly +ve.

Relative Magnetic Permeability:-

It is defined as the ratio of magnetic field inside a substance to the applied magnetic field.

$$\mu_r = \frac{B}{H}$$

Relation between susceptibility and magnetic permeability:-

$$B = B_0 + B_m$$

$$\mu H = \mu_0 H + \mu_0 I$$

$$\mu H = \mu_0 (H + I)$$

$$\frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \frac{I}{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi$$

Hysteresis:-

The variation of magnetic field inside a ferromagnetic substance and applied magnetic field for a complete cycle of magnetisation and demagnetisation is called hysteresis loop.

